



Especificidad de Anticuerpos anti HLA clase I y/o II con antígenos individuales (Single por Luminex™)

Fecha Informe : Jueves, 15 de mayo de 2025

Nombre Paciente	: [REDACTED]	N° Reg Isp	: [REDACTED]
Rut	: [REDACTED]	Num. Muestra	: [REDACTED]
Procedencia	: Clínica Alemana	Toma Muestra	: 05-05-2025
Médico Solicitante	: [REDACTED]	Tipo de Muestra	: S. S/Aditivos
Ingreso Muestra	: 05-05-2025	Asignación	:

Método : Inmunoensayo en fase sólida por fluorometría Luminex con antígenos HLA Individuales purificados clase I y/o clase II

Interferencia : Presencia en el suero de complejos inmunes u otros agregados de Inmunoglobulinas

vPRA : PRA virtual calculado con la frecuencia de antígenos HLA A, B, DR, DQ de población chilena de donantes cadavéricos.

MFI : Mediana de la intensidad de fluorescencia neta o corregida.

La discordancia del screening de anticuerpos con el test de antígenos individuales puede deberse a: títulos bajos de anticuerpos, antígenos de baja frecuencia o no representados en el panel.

Observaciones

vPRA : 98 %
Antígenos de locus HLA- DP no han sido tipificados. Se sugiere solicitar tipificación HLA-de este locus del receptor.



Instituto de Salud Pública de Chile
Subdepartamento
Enfermedades no Transmisibles
HISTOCOMPATIBILIDAD

